

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач
КГБУЗ "КМРД №1"

О.В. Кунилова

ПЕРЕЧЕНЬ

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи в условиях дневного стационара и в неотложной форме, специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, паллиативной помощи в стационарных условиях на 2025 - 2026 год.

КГБУЗ "КМРД №1"

№ пп	МНН ЛП	Форма выпуска	Категория ФК/ЖНВЛП	Примечания
1	2	3	4	5
1	АНЕСТЕТИКИ			
1.1	СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА			
	Кетамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5%-2 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, артериальная гипертензия (и др. состояния, при которых повышение АД противопоказано), стенокардия или инфаркт миокарда (в т.ч. в последние 6 мес), выраженная почечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе), преэклампсия, эклампсия, эпилепсия и эпилептический синдром (особенно у детей, высокая предрасположенность к эпилепсии)
	Динитроген оксид	Газ сжатый для ингаляционного наркоза баллоны 10 л	ЖНВЛП	
	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения ампулы 10мг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность.
	Севофлуран	Жидкость для ингаляций флаконы 250 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (подтвержденная или подозреваемая генетическая восприимчивость)
	Мидзолатем	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения	ЖНВЛП	
	Робинетал натрий	Инъекционный раствор для внутривенного введения флаконы 1,0	ЖНВЛП	п/п период лактации
1.2	МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ			
	Лидокаин	Раствор для инъекций ампулы 5мг/мл/5мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. амидным местноанестезирующим ЛС).
	Прокан	Раствор для инъекций ампулы 5мг/мл/10мл	ЖНВЛП	Для анестезии методом полусухого инфильтрата: выраженные фиброзные изменения в тканях, для субаракноидальной анестезии - АВ блокада, кровотечения, артериальная

					ипотензия, шок, инфицирование места проведения люмбальной пункции, септицемия.
Ропивакаин		Раствор для инъекций ампулы 10мг/мл/10 мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, детский возраст (до 12 лет).
Лидокаин		Спрей для местного применения дозированный 10%, Гель для местного применения 5 %	ЖНВЛП		Гиперчувствительность; СССУ (особенно у больных пожилого возраста), АВ блокада III ст. (кроме случаев, когда введен зонд для стимуляции желудочков), СА блокада, синдром WPW, кардиогенный шок, нарушения внутрисердечковой проводимости.
		Раствор для инъекций ампулы 20мг/мл/1мл			
2. МИОРЕЛАКСАНТЫ И АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА					
Неостигмина метилсульфат		Раствор для инъекций ампулы 0,05мг/мг/1мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, эпилепсия, гиперкинезы, ваготомия, ИБС, брадикардия, аритмия, стенокардия, бронхиальная астма, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, перитонит, механическая обструкция ЖКТ и мочевыводящих путей, гипертрофия предстательной железы, период острого инфекционного заболевания, интоксикация у резко ослабленных детей, беременность, период лактации.
Пилекурония бромид		Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения ампулы 4мг	ЖНВЛП		Гиперчувствительность.
Суksamетония йодид		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 20мг/мл/5 мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (в т.ч. в анамнезе), миастения, врожденная и дистрофическая миотония, мышечная дистрофия Дюшенна, закрытоугольная глаукома, острая печеночная недостаточность, отек легких, проникающие травмы глаза, бронхиальная астма, гиперкалиемия, грудной возраст (до 1 года), беременность
Суksamетония хлорид		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2мг - 5 мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (в т.ч. в анамнезе), миастения, врожденная и дистрофическая миотония, мышечная дистрофия Дюшенна, закрытоугольная глаукома, острая печеночная недостаточность, отек легких, проникающие травмы глаза, бронхиальная астма, гиперкалиемия, грудной возраст (до 1 года), беременность

3.	Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подagra			
3.1	Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия			
	Морфин	Раствор для инъекций ампулы 10мг/мл /1 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра (в т.ч. на фоне алкогольного или наркотического отравления) и ЦНС, паралитическая кишечная непроходимость.
	Тримеперидин	Раствор для инъекций ампулы 20мг/мл/1мл	ЖНВЛП	При эпидуральной и спинальной анестезии - нарушение свертывания крови (в т.ч. на фоне антикоагулянтной терапии), инфекции (риск проникновения инфекции в ЦНС); диарея на фоне псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоридами, линкозамидами, пенициллинами, токсическая диспепсия (замедление выведения токсинов и связанное с этим обострение и пролонгация диареи); одновременное лечение ингибиторами MAO (в т.ч. в течение 21 дня после их применения).
	Фентанил	Раствор для инъекций ампулы 0,05мг/мл/ 2мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, тяжелое угнетение дыхательного центра, ТТС - острые или послеоперационные боли (невозможность адекватного подбора дозы при коротком периоде лечения, что может привести к тяжелой или угрожающей жизни гиповентиляции), раздраженная, облученная или поврежденная кожа (в месте аппликации), диарея на фоне псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоридами, линкозамидами, пенициллинами, токсическая диспепсия; острое угнетение дыхания, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.
	Трамadol	Раствор для инъекций ампулы 50мг/мл/ 2мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, отравление алкоголем, снотворными ЛС, наркотическими анальгетиками и др. психоактивными ЛС, прием ингибиторов MAO, риск суицида, склонность к злоупотреблению психоактивными веществами, беременность, период лактации (в случае длительного применения). детский возраст (до 1 года - для парентерального введения; до 14 лет - для приема внутрь).
3.2	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства			
	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки 0,1	ЖНВЛП	Гиперчувствительность к АСК (в т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический диатез, бронхиальная астма, рецидивирующая полипозная астма, сочетание бронхиальной астмы и язвенного поражения желудка, острый ревматизм, системная красная волчанка, врожденная порфирия, гемофилия, гемофилия А (в I триместре беременности прием АСК противопоказан), беременность (II и III триместры), период лактации.
	Диклофенак	Суппозитории ректальные 0,1	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК или др. НПВП (в т.ч. в анамнезе), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника, тяжелая печеночная и сердечная недостаточность; период после проведения аортокоронарного шунтирования; тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, активное заболевание печени, подтвержденная гиперкалиемия, беременность (III триместр), период лактации.

	Лидокаин + прилокаин	мазь для местного и наружного применения		детский возраст (до 14 лет - для таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкой 50 мг, и суппозиторов ректальных 50 мг, до 18 лет - для таблеток пролонгированного действия 100 мг)
	Ибупрофен	таблетки покрытые оболочкой 0,2	ЖНВЛП ЖНВЛП	недоношенные новорожденные, родившиеся при сроке беременности менее 37 нед. Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), бронхиальная астма, ринит или крапивница в анамнезе, вызванные приемом АСК или др. НПВП, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (обострение), язвенный колит (обострение), болезнь Крона, дивертикулит, пептическая язва, гемофилия и др. нарушения свертывания крови, активное желудочно-кишечное кровотечение; тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения аортокоронарного шунтирования, подтвержденная гиперкалиемия, воспалительные заболевания кишечника, детский возраст (до 6 лет), беременность (III триместр).
	Диметилсульфоксид	концентрат для приготовления раствора для наружного применения	ЖНВЛП	Беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет
	Кетопрофен	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 50мг/мл, Свечи 0,1	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), бронхиальная астма, ринит или крапивница в анамнезе, вызванные приемом АСК или др. НПВП, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (обострение), язвенный колит (обострение), болезнь Крона, дивертикулит, пептическая язва, гемофилия и др. нарушения свертывания крови, активное желудочно-кишечное кровотечение; тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения аортокоронарного шунтирования, подтвержденная гиперкалиемия, воспалительные заболевания кишечника, детский возраст (до 6 лет), беременность (III триместр).
	Парацетамол	Раствор для инфузий 10мг/мл, 100мл Таблетки 0,5 Суппозитории ректальные 0,1	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, период новорожденности (до 1 мес).
	Индометацин	Суппозитории ректальные 0,1	ФК	Гиперчувствительность, бронхиальная астма, крапивница или острый ринит, спровоцированные приемом АСК или др. НПВП; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона), кровотечения (в т.ч. внутреннее, из сосудов ЖКТ), врожденные пороки сердца (тяжелая легочная гипертензия, атрезия легочной артерии, тяжелая легочная гипертензия после аортокоронарного шунтирования), почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), гемофилия, удлинение времени кровотечения (склонность к кровотечениям), печеночная недостаточность, активные заболевания печени, ХТН (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, нарушения функции печени (лейкопения и анемия), подтвержденная гиперкалиемия, беременность, период лактации.

					для ректального применения - ректальное кровотечение, проктит, геморрой, детский возраст (до 14 лет).
4.	СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ				
	Хлоропирамин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 20мг/мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, беременность, период лактации, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, дыхательная недостаточность, одновременный прием ингибиторов МАО, ранний грудной возраст (до 1 мес).
5.	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ				
5.3	АНКСИОЛИТИКИ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ)				
	Диазепам	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 0,5%- 2мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, кома, шок, острая алкогольная интоксикация с ослаблением жизненно важных функций, острые интоксикации ЛС, оказывающими угнетающее действие на ЦНС (в т.ч. наркотические анальгетики и снотворные ЛС), миастения
	АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА				
	Галоперидол	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5мг/мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, тяжелое угнетение функции ЦНС на фоне интоксикации ксенобиотиками, комы различного генеза, заболевания ЦНС, сопровождающиеся пирамидной или экстрапирамидной симптоматикой (в т.ч. болезнь Паркинсона), беременность, период лактации, детский возраст (до 3 лет).
	Дроперидол	Раствор для инъекций ампулы 2,5мг/мл/ 5мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, экстрапирамидные нарушения, назначение во время проведения кесарева сечения, гипоталикемия, артериальная гипотензия, синдром удлинения интервала Q-T, детский возраст (до 2 лет).
5.7	Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма				
	Налоксон	Раствор для инъекций ампулы 0,4мг/мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность.
5.8	ПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ				
	Кофеин	Раствор для инъекций ампулы 10%- 1мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность (в т.ч. к др. ксенобиотам), тяжелые расстройства (агорафобия, панические расстройства), органические заболевания ЦНС (в т.ч. острый инфаркт миокарда, атрофия сердца), паркинсонизм, тахикардия, гипертоническая энцефалопатия, экстрапирамидная, артериальная гипертензия, нарушения сна, детский возраст до 12 лет (для пероральных ЛФ), детский возраст до 18 лет (для субкутаных инъекций введения).
	Даксидофин	Таблетки 0,05	ФК		

Доксилина сукцинат		Таблетки покрытые пленочной оболочкой 0,015	ФК	Закрываются глаукома, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, задержка мочи, период лактации, детский возраст до 6 лет (в качестве антигистаминного средства), детский и подростковый возраст до 15 лет (в качестве седативно-снотворного средства), повышенная чувствительность к доксилину
6 средства для профилактики и лечения инфекций				
антибактериальные средства				
6	Азитромицин	Таблетки покрытые оболочкой 0,5 Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий флакон 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к макролидам), тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, период лактации, детский возраст (до 12 лет с массой тела менее 45 кг - капсулы, таблетки; до 6 мес - суспензия для приема внутрь: эффективность и безопасность не установлены).
	Амикацин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флакон 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит слухового нерва, тяжелая ХПН с азотемией и уремией, беременность.
	Амоксициллин/клавулановая кислота	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения флакон 1,0 + 0,2, таблетки покрытые оболочкой 0,875+0,125	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации.
	Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения флакон 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации.
6.1	Ампициллин/сульбактам	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флакон 1,0+0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации.
	Бензилпенициллин+бензилпенициллин проквина+бензилпенициллин	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения флакон 600 тыс. ед.	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации.
	Секундарная инфекция	Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения флакон 1,0+0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспорином, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации.
	Ванкомицин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий флакон 1,0	ЖНВЛП	Нарушение слуха (в т.ч. в анамнезе), почечная недостаточность, беременность.

Гентамицин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 40мг/мл; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения флаконы 80 мг	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит слухового нерва, тяжелая ХПН с азотемией и уремией, новорожденные (до 1 мес).
Доксциклин	Капсулы 0,1 Лиюфилизат для приготовления раствора для внутривенного введения флакон 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения, беременность (II-III триместры), период лактации, детский возраст (до 8 лет - возможность образования нерастворимых комплексов Са ²⁺ с отложением в костном скелете, эмали и дентине зубов), для в/в введения - миастения.
Джозамицин	Таблетки, покрытые оболочкой 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к макролидам), тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, период лактации, детский возраст (до 12 лет с массой тела менее 45 кг - капсулы, таблетки; до 6 мес - суспензия для приема внутрь; эффективность и безопасность не установлены).
Меропенем	Лиюфилизат для приготовления раствора для внутривенного введения флакон 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, детский возраст (до 3 мес).
Моксифлоксацин	Раствор для инфузий флакон 1,6 мг/мл Таблетки, покрытые оболочкой 0,4	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, возраст до 18 лет, эпилепсия, тяжелая диарея, беременность, период лактации
Левифлоксацин	Раствор для инфузий флакон 5 мг/мл Таблетки, покрытые оболочкой 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, возраст до 18 лет, эпилепсия, тяжелая диарея, беременность, период лактации
«Герцинан»	Таблетки для вагинального применения	ФК	
Цефазолин	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флаконы 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, период новорожденности (до 1 мес).
Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флаконы 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспорином, пеницилинам, др. бета-лактамам антибиотикам), детский возраст (до 2 мес).
Цефтриаксон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0,4	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспорином, пеницилинам, др. бета-лактамам антибиотикам), детский возраст (до 2 мес).
Цефоперазон/сульбактам	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флаконы 1,0 + 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, недоношенные новорожденные (1 мес) по жизненным показаниям
Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций; флаконы 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к пеницилинам, др. цефалоспорином, карбапенемам), детский возраст - до 2,5 лет).

	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флаконы 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, в т.ч. к др. цефалоспорином, пенициллинам.
	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения флаконы 1,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспорином, пенициллинам, карбапенемам), гипербилирубинемия у новорожденных, новорожденные, которым показано в/в введение растворов, содержащих Ca ²⁺ .
	ципрофлоксацин	Раствор для инфузий флаконы 0,2; таблетки покрытые оболочкой 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, возраст до 18 лет, эпилепсия, тяжелая диарея, беременность, период лактации
	Бацитрацин + неомицин	Порошок для наружного применения 10г	ФК	С осторожностью беременным, п-д лактации
	Фосфомидин	Гранулы для приготовления раствора для применения внутри 0,5	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, тяжелая ХПН (КК менее 10 л/мин) - для гранул, детский возраст (до 5 лет - для гранул, до 12 лет - для парентерального введения), период лактации.
	Диоксометилтергидропиримидин+Хлорамфеникол	Мазь для наружного применения	ФК	
	Эртапенем	Линофилзат для внутривенного и внутримышечного введения	ЖНВЛП	препаратам, тяжелая артериальная гипотензия, нарушение внутрисердечной проводимости.
	Сульфациетамид	Капли глазные	ФК	Гиперчувствительность
6.3	ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА			
	Ацикловир	Мазь для местного и наружного применения тубы 5% -5,0	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к валацикловиру), детский возраст до 3 лет (для твердых лф).
	Лановир + Гидрокортизон	Область поражения слизистой оболочки 0,3 - 0,025	ЖНВЛП	ХВП, гиперчувствительность
	Муселтанвир	Капли 0,075	ЖНВЛП	ХВП, гиперчувствительность
	Интерферон альфа 2b	Свечи ректальные 500МЕ, 1 млн, капли назальные	ЖНВЛП	ХВП, гиперчувствительность
6.4	ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА			
	Клотримазол	Таблетки вагинальные 0,1	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, менструальный период (для вагинальных форм), беременность (I триместр).

	Флуконазол	Капсулы 0,05; 0,15 Раствор для инфузий флаконы 0,2% по 50, 100 и 200 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. азольным противогрибковым ЛС в анамнезе), одновременный прием терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более) и аспермидола, период лактации.
	Противопротозойные и противомаларийные средства			
	Метронидазол	Таблетки 0,25 Раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, лейкопения (в т.ч. в анамнезе), органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия), печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз), беременность (I триместр), период лактации.
6.7	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций			
	Бифидобактерии бифидум	Лнофиллизат для приготовления раствора для приема внутрь 5 доз	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, детский возраст (до 3 лет - таблетки, суппозитории).
6.8	ИММУНОГЛОБУЛИНЫ			
	Иммуноглобулин человека антиреус Rho (D)	Раствор для инъекций 1 доз.	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, резус-отрицательные родильницы, sensibilizированные к антигену Rh(D), в сыворотке крови которых обнаружены резус-антитела; новорожденные.
	Иммуноглобулин против гепатита В человека	Раствор для инфузий 50 мг/мл/2 мл	ЖНВЛП	
6.7	Иммуноглобулин человека нормальный	Раствор для инфузий ампулы 10 мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, местная или генерализованная инфекция, селективный дефицит IgA, беременность, период лактации; острое и/или тяжелое течение заболевания
9	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЬ			
9.1	ПРОТИВОАНЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА			
	Железа (III) гидроксид сахарозный комплекс	Раствор для внутривенного введения ампулы 20 мг/мл/5 мл, таблетки жевательные 100 мг	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гемохроматоз, гемохроматоз.
	Железа карбоксималтозат	раствор для внутривенного введения, 50 мг/мл, флакон 10 мл	ЖНВЛП	анемия, не связанная с дефицитом железа, например, другая микроцитарная анемия; признаки перегрузки железом или нарушения утилизации железа; беременность (I триместр);
	Фerroвакс кислота	Таблетки 0,0004	ЖНВЛП	Гиперчувствительность
	Цинкобальмин	Раствор для инъекций ампулы 30 мг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гемохроматоз, эритроцитоз, беременность (I триместр), дефицит витамина В12, дефицит витамина В9 (имеются отдельные указания о возможном терапевтическом действии витаминных групп В12 в высоких дозах), период лактации.
9.2	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ			

Аминокaproновая кислота	Раствор для инфузий флаконы 5%-100мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, гиперкоагуляция (тромбообразование, тромбоэмболия), склонность к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям, нарушения мозгового кровообращения, ДВС-синдром, беременность.
Гепарин натрия	Раствор для инъекций флаконы 5000ед-5мл	ЖНВ/ЛП	пл/л беременным, п-д лактации, с осторожностью пожилым старше 60 лет (особенно женщинам)
Гепарин натрий-бензокаин-бензилникотинат	Мазь для наружного применения тубы 25,0	ФК	
Транексамовая кислота	Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл /5 мл, таблетки 500 мг	ЖНВ/ЛП	венозный или артериальный тромбоз в настоящее время или в анамнезе (в т.ч. тромбоз глубоких вен ног, тромбоэмболия легочной артерии, тромбоз внутрисердечных сосудов) при невозможности одновременной терапии антикоагулянтами;
Натропарин кальция	Раствор для инъекций ампулы 9500 МЕ/мл /0,3мл	ФК	
Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций ампулы 100мг/мл	ЖНВ/ЛП	пл/л беременным, п-д лактации
РАСТВОРЫ И ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛИ			
Аминокислоты + минералы и декстроза	раствор для инфузий, контейнеры пластиковые двоярным объемом 1000мл и 2000мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, тяжелая почечная недостаточность при отсутствии возможности гемодиализации или диализа, тяжелая печеночная недостаточность, врожденные
Жировые эмульсии для парентерального питания	Эмульсия для инфузий 10%	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, нарушение липидного обмена
Гидроксэтилкрахмал	Раствор для инфузий флаконы 6% - 250 мл, 500мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к крахмалу), внутрисердечная гипертензия, артериальная гипертензия, внутрисердечное кровоотечение, декомпенсированная ХСН, острая почечная недостаточность (олиго-, анурия), отек легких (в т.ч. кардиогенный), гипергидратация (включая отек легкого), гиперолемия, дегидратация (при необходимости коррекции электролитного обмена), выраженные нарушения свертывающей системы крови (в т.ч. тяжелый геморрагический диатез, гипокоагуляция, гиподриблингемия).
Декстран	Раствор для инфузий флаконы 200мл, 400мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, кровотоочивость, тромбодитогенез, декомпенсированная ХСН (опасность развития отека легких); почечная недостаточность (олиго-, анурия).
Декстроза	Раствор для инфузий флаконы 5%-250мл, 500мл ампулы 40%-10мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, гипонатриемия, гиперосмолярная, гипергидратация, послеоперационные нарушения утилизации глюкозы, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких, отек мозга, острая почечная недостаточность, недостаточность, гиперосмолярная кома, детский возраст (для растворов свыше 20-25%)
2.4 ПРЕПАРАТЫ КРОВИ			
Альбумин человека	Раствор для инфузий 20%, 100мл	ЖНВ/ЛП	Общеклинические противопоказания к применению радионуклидных исследований. Беременность, период лактации.

	Эптакот альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, флаконы 1,2 мг (60 КЕД)	ЖНВЛП	С осторожностью беременным, п-д лактации
10.	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ			
	Амиодарон	Раствор для внутривенного введения ампулы 50мг/мл/3мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к йоду), СССУ (синусовая брадикардия, SA блокада) в отсутствие кардиостимулятора, нарушение внутрисердечной проводимости (двух-, трехпучковые блокады) в отсутствие кардиостимулятора, АВ блокада II-III ст. (без использования кардиостимулятора), кардиогенный шок, гипокалиемия, гипомagneмизм, коллапс, выраженная артериальная гипотензия, гипотиреоз, гипопаратиреоз, врожденное
	Периндолол	раствор для инъекций 1 мг/мл/10мл	ЖНВЛП	
	Атропин	Раствор для инъекций ампулы 0,1%-1мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность.
	Добутамин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий флаконы 0,25	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, ГОКМП, тахикардия сердца, феохромоцитомы, желудочковые аритмии (в т.ч. фибрилляция желудочков).
	Допамин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий ампулы 5 мг/мл/5мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитомы, фибрилляция желудочков
	Клонидин	Раствор для внутривенного введения, ампулы 0,1мг/мл/1-мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, выраженная синусовая брадикардия, СССУ, АВ блокада II-III ст., беременность, период лактации, детский возраст
	Метилдопа	Таблетки 0,25	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гемолитическая анемия, острый гепатит, цирроз печени, печеночная и/или почечная недостаточность, системные заболевания соединительной ткани, паркинсонизм, депрессия, феохромоцитомы, острый инфаркт миокарда, выраженный коронарный атеросклероз и атеросклероз сосудов головного мозга, одновременный прием ингибиторов МАО, леводопы.
	Метопролол	Таблетки 0,05, Раствор для внутривенного введения, 1 мг/мл ампулы	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда (интервал P-Q более 0,24 с или систолическое АД менее 100 мм рт.ст.) кардиогенный шок, АВ блокада II-III ст., СССУ, клинически значимая синусовая брадикардия, декомпенсированная ХСН артериальной гипертензией, лава, острая надпочечниковая недостаточность, сердечная недостаточность, гипотиреоз, гипопаратиреоз, гипотензия
	Нитроглицерин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/мл, спрей подязычный 1,25 мг доза	ЖНВЛП	

Нифедипин	Таблетки 0,01 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 0,03	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.), кардиогенный шок, коллапс, выраженный аортальный или субаортальный стеноз, нестабильная стенокардия, острый период инфаркта миокарда (в течение первых 4 нед), СССУ, АВ блокада II-III ст., беременность (до 20 нед), период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не исследованы).
Моксонидин	таблетки покрытые пленочной оболочкой 200, 400 мг	ЖНВ/ЛП	Выраженная брадикардия (менее 50 уд./мин), СССУ, АВ-блокада II и III степени, острая и хроническая сердечная недостаточность, период лактации (грудного вскармливания), детский и подростковый возраст до 18 лет, повышенная чувствительность к моксонидину, лейкопения, детский возраст (до 18 лет).
Фенилэфрин	Раствор для инъекций ампулы 10мг/мл/1мл, Канли глазные, 2,5 % - 5 мл,	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция желудочков.
Эналаприл	Таблетки 0,02	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. ангионевротический отек при лечении ингибиторами АПФ в анамнезе), порфирия, беременность, период лактации, детский возраст, больные, находящиеся на гемодиализе с использованием полиакрилонитрильных мембран при аферезе на декстран сульфат, непосредственно перед десенсибилизацией от осинога или пчелиного яда.
Эналаприлат	Раствор для внутривенного введения 1,25мг/мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. ангионевротический отек при лечении ингибиторами АПФ в анамнезе), порфирия, беременность, период лактации, детский возраст, больные, находящиеся на гемодиализе с использованием полиакрилонитрильных мембран, при аферезе на декстран сульфат, непосредственно перед десенсибилизацией от осинога или пчелиного яда.
Каптоприл	Таблетки 0,025	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. ангионевротический отек при лечении ингибиторами АПФ в анамнезе), порфирия, беременность, период лактации, детский возраст, больные, находящиеся на гемодиализе с использованием полиакрилонитрильных мембран, при аферезе на декстран сульфат, непосредственно перед десенсибилизацией от осинога или пчелиного яда.
Уралмолг	Раствор для внутривенного введения 2мг/мл 5мл	ЖНВ/ЛП	Беременность и период грудного вскармливания, гиперчувствительность.
Эпинефрин	Раствор для инъекций ампулы 1мг/мл/1мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитома, атеросклероз, атерогенная гиперлипидемия, ИБС, тахикардия, тахисистолия, беременность, период лактации.
11.5	ТЕСТ-СИСТЕМЫ		
Тест системы для выявления антител ВИЧ		ЖНВ/ЛП	

12. АНТИСЕПТИКИ И СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ				
Бриллиантовый зеленый	Раствор для наружного применения спиртовой флаконы 5%- 10мл	ЖНВЛП		
Павидон - Йод	Раствор для местного и наружного применения флаконы 2%, суппозитории вагинальные	ЖНВЛП		п/л детям до 1 мес (особенно недоношенным), с осторожностью беременным (2 и 3 триместр), п-д лактации
Этанол	Раствор спиртовой для наружного применения флаконы 70% и 95% 100мл	ЖНВЛП		и гиперчувствительность.
Хлоргексидин	Раствор для наружного применения, флакон 0,5% 100 мл, суппозитории вагинальные	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, дерматиты.
Аммиак	Раствор для наружного применения и ингаляций флаконы 10% 40 мл и 400 мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность; при наружном применении - нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и др. заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.
Детонь-трибромфенолят висмута и висмута оксида комплекс	Мазь для наружного применения флаконы 40,0	ФК		
13. Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта				
13.1 Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и ДПК				
Метоклопрамид	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5мг/мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, кровотечения из ЖКТ, стеноз привратника желудка, механическая кишечная непроходимость, перфорация стенки желудка или кишечника, босяхромоцитоза, экстрапирамидные нарушения, эпилепсия, пролактинзависимые
Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые 0,02	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, детский возраст, период лактации.
Эзометразол	Лифогилат для приготовления раствора для инфузий Таблетки, покрытые оболочкой 0,04	ЖНВЛП		Гиперчувствительность (в т.ч. к замещенным бензимидазолам), одновременный прием с атаканавиром (снижается концентрация в плазме атаканавира), период лактации.
ЦЕГОТИВОРВОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ				
Цетилэстерон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2мг/мл/4мл	ЖНВЛП		Гиперчувствительность
13.3 СИМПОМПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА				
Дрогитарин	Раствор для инъекций ампулы 20 мг/2,0	ЖНВЛП		Гиперчувствительность, выраженная печеночная и почечная недостаточность, таястая ХСН, период лактации; детский возраст до 18 лет (для дозировки 80 мг).

13.4	ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ЭНЗИМЫ					
	Панкреатин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	ЖНВЛП			Гиперчувствительность, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.
13.5	АНТИДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА					
	Смектит диоктаэдрический	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	ЖНВЛП			Гиперчувствительность, кишечная непроходимость
13.6	СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА					
	Лактулоза	Сироп 667 мг/мл флаконы 200мл	ЖНВЛП			Гиперчувствительность, ректальные кровотечения, недиагностированные, колостомы, подозрение на аппендицит, галактоземия, непроходимость кишечника.
	Саметикон	капсулы 0,04	ЖНВЛП			
	Натрия пикосульфат	Капли для приема внутрь 7,5 мг/мл				Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, боль в животе (неясного генеза), тяжелая дегидратация, кровотечения из ЖКТ, метроррагия, цистит, спастический запор, детский возраст (до 4 лет), беременность (I триместр).
13.7	Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей					
	Адеметионин	Линофиллат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5 мл	ЖНВЛП			Гиперчувствительность, беременность (I-II триместр), период лактации.
	Урсодезоксихолевая кислота	капсулы 0,25	ЖНВЛП			Первичный билиарный цирроз при отсутствии признаков декомпенсации (симптоматическая терапия), растворение мелких и средних холестериновых камней при функционирующем желчном пузыре, билиарный рефлюкс-гастрит.
14.	ГОРМОНЫ И СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ					
	НЕНОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И АНТИГОРМОНЫ					
	Гидрокортизон	Линофиллат для приготовления раствора для инъекций ампулы 2,5%-2мл	ЖНВЛП			Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность. Для внутрисуставного введения. Предшествующая артропластика, патологическая кровоточивость (эндокринная или вызванная применением антикоагулянтов), внутрисуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный острый респираторный синдром, отсутствие признаков воспаления в суставе (в т.ч. "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовиита), выраженная костная дегенерация и дегенерация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как осевого сустава, артральный процесс в суставе, остеомиелит, остеонекроз. Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность.
14.1	Дексаметазон	Раствор для инъекций ампулы 4мг/мл	АНВЛП			
	Бромокриптин	Таблетки 2,5мг	ЖНВЛП			Гиперчувствительность, гипотония, артериальная гипертензия в послеродовом периоде, заболевания ССС, заболевания клапанного аппарата сердца в анамнезе, эндогенные психозы, неконтролируемая артериальная гипертензия, печеночная недостаточность.

Октреотид	Раствор для внутривенного и подкожного введения 300мг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность.
Каберголин	Таблетки 0,5 мг	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным спорыньи), период лактации
Преднизолон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 30мг/мл	ЖНВЛП	Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность. Для внутрисуставного введения: вызванная применением антикоагулянтов), черессуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе (так называемый "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих сустав эпифизов костей.
Этинилэстрадиол	Таблетки 50мкг	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, беременность, эстрогензависимые новообразования или подозрение на них, необычное или недиагностированное генитальное или маточное кровотечение, тромбоз и/или тромбозы, тромбозы в активной фазе (за исключением лечения рака молочной и предстательной желез).
14.4. Гестагены			
Прогестерон	Капсулы 0,1-0,2	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, рак молочной железы и половых органов
Дидрогестерон	Таблетки, покрытые оболочкой 0,01	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, период лактации.
14.5. ИНСУЛИНЫ И СРЕДСТВА ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА			
Инсулин двуфазный (человеческий) (гепноинженерный)	Суспензия для подкожного введения флаконы 100 МЕ/10мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гипогликемия.
Инсулин растворимый (человеческий) (гепноинженерный)	Раствор для инъекций флаконы 100МЕ / 10мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гипогликемия.
Инсулин-изовон (человеческий) (гепноинженерный)	Суспензия для подкожного введения флаконы 100 МЕ / 10мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, гипогликемия.
14.5. ДИУРЕТИКИ			

Фуросемид		Раствор для инъекций 10мг/мл/1мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, ОПН
16.	СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ			
16.1	Миотические средства			
	Пиклоксидин дигидрохлорид	капли глазные 0,05% флакон капельница 10мл	ФК	
	Тропикамид	Капли глазные флаконы 1%-5мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, глаукома, повышение внутриглазного давления
17.	СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МУСКУЛАТУРУ МАТКИ			
	Гексопреналин	Таблетки, раствор для внутривенного введения ампулы 5мкг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, мерцательная тахикардия, миокардит, КМП (в т.ч. ГОКМП), ИБС, артериальная гипертензия, печеночная и/или почечная недостаточность, эссенциальная гипертензия, гипертоническая болезнь, атеросклероз, заболевания сердечно-сосудистой системы
	Дипропостон	Гель, интрацерикальный шприц 0,5мг	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, кесарево сечение или большие хирургические вмешательства на матке (в анамнезе); несоответствие размеров таза и головки плода, трудные или травматичные роды (в анамнезе); 6 или более доношенных беременностей (в анамнезе);
	Магния сульфат	Раствор для внутривенного введения 250мг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия, угнетение дыхательного центра, выраженная брадикардия, АВ блокада, тяжелая ХПН (КК менее 20 мл/мин), предродовый период (за 2 ч до родов).
	Метилэргометрин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 0,2%-2мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, беременность, первый период родов, второй период родов до появления головки плода (тоническое сокращение мускулатуры матки может вызвать асфиксию плода), нефропатия, период лактации, артериальная гипертензия, облитерирующие заболевания периферических сосудов, сепсис.
	карбетацин	Раствор для внутрисосудного и внутримышечного введения	ЖНВЛП	
	Мизопростол	Таблетки 0,002	ЖНВЛП	Гиперчувствительность к простагландинам

Мифепристон	Таблетки 0,2	ФК	Для всех показаний: гиперчувствительность, надпочечниковая недостаточность и длительная ГКС-терапия, острая или хроническая почечная или печеночная недостаточность, порфирия, анемия, нарушения гемостаза (в т.ч. предшествующее лечение антикоагулянтами), наличие тяжелой экстрагенитальной патологии.
Атозибан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/мл 0,9мл - 5 мл	ЖНВЛП	
Окситоцин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 5МЕ/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность; Узкий таз (анатомический и клинический), поперечное и косое положение плода, лицевое предлежание плода, преждевременные роды, угрожающий разрыв матки, рубцы на матке (после перенесенного ранее кесарева сечения, операции на матке), чрезмерное растяжение матки, матка после многократных родов, частичное предлежание плаценты, маточный сепсис, инвазивная карцинома шейки матки; гипертонус матки (возникший не в ходе родов), сдавление плода, артериальная гипертензия, ХГН.
18. ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА			
Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций 200 доз	ЖНВЛП	
Аминофиллин	раствор для инъекций ампулы 2,4%-10мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным ксантина: кофеин, пентоксифиллин, теобромин), эпилепсия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения - для пероральных форм, особенно таблеток непродолжительного действия), гастрит с повышенной кислотностью, тяжелая артериальная гипер- или гипотензия, тяжелые тахикардиями, гемодинамический исход, кровоизлияние в сетчатку глаза
Иpratropium бромид, фенотерол Амброксол	Раствор для инъекций дозированный ампулы 20мл Раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 7,5 мг/мл, таблетки 0,03, раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5 мг/мл флаконы	ЖНВЛП ЖНВЛП	Гиперчувствительность (в т.ч. к атропину и его соединениям), тахикардия, ГОМКП.
Оксиметазолин	Капли назальные 0,025%	ФК	Гиперчувствительность, беременность (I триместр) фенилкетонурия
Посадисин эдифа	Сустейн для ингаляционного введения 80мг/мл	ЖНВЛП	Гиперчувствительность, атрофический ринит, детский возраст (до 6 лет - для глазных капель)
			Гиперчувствительность

19. РАСТВОРЫ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ, СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНОГО РАВНОВЕСИЯ

Калия хлорид	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 40мг/мл	ЖНВ/ЛП	Гиперкалиемия, полная АВ блокада, надпочечниковая недостаточность, ХПН, сопутствующая терапия калийсберегающими диуретиками, метаболические нарушения (ацидоз, гиповолемия с гипонатриемией), эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
Калия хлорид+ кальция хлорид дигидрат+ магния хлорид дегсатидрат+ натрия ацетат тригидрат+ натрия хлорид+ яблочная кислота	Раствор для инфузий 1000мл	ЖНВ/ЛП	Гиперволемия, тяжелая сердечная недостаточность
Желатин	Раствор для инфузий 4%	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, гиповолемия, тяжелая ХСН.С осторожностью. Гипергидратация, ХПН, геморрагический диатез, отек легких, гипокалиемия, гипонатриемия.
Натрия хлорид	Раствор для инфузий флакон 0,9%-500мл	ЖНВ/ЛП	Гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация, циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, острая ЛЖ недостаточность, сопутствующее назначение ГКС в больших дозах.
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Натрия хлорид]	Раствор для инфузий 250мл, 400мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, гиповолемия, гипертоническая дегидратация, гиперкалиемия, гипернатриемия, артериальная гипертензия, сердечная или почечная недостаточность, гиперхлоремия, алкалоз, печеночная недостаточность (снижение образования гидрокарбоната из лактата), гиперлактацидемия.

20. ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ

Гаманл	раствор для внутримышечного введения 50 мг/мл	ЖНВ/ЛП	Индивидуальная непереносимость препарата
Пиридоксин	раствор для инъекций 50 мг/мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность
Декспантенол	Мазь для наружного применения 5 %	ФК	
Калия магния аспартат	раствор для внутривенного введения ампулы 10 мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гипернатриемия, недостаточность легочного кровообращения, АВ блокада, нарушение обмена аминокислот, гемолиз, тяжелые нарушения.
Менадiona натрия бисульфит	Раствор для внутримышечного введения ампулы 1% 1мл	ЖНВ/ЛП	Гиперчувствительность, гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорожденных.

21. ПРОЧИЕ СРЕДСТВА

Вазелин	масть 100 мл	ФК	
---------	--------------	----	--

Кальция глюконат	Раствор для инъекций ампулы 10%-10мл	ФК	Гиперчувствительность, гиперкальциемия (концентрация Ca^{2+} не должна превышать 12 мг% = 6 мЭкв/л), выраженная гиперкальциурия, нефроулитиаз (кальциевый), саркоидоз, одновременный прием сердечных гликозидов (риск возникновения аритмий).
Кальция хлорид	Раствор для инъекций ампулы 10%-10мл	ЖНВЛП	Гиперкальциемия, гиперкальциурия, тяжелая ХПН, фибрилляция желудочков, мочекаменная болезнь, саркоидоз, одновременный прием сердечных гликозидов, беременность, период лактации.
Водорода перексид	Раствор для местного и наружного применения флаконы 3%- 40мл и 100мл	ЖНВЛП	
Валерианы экстракт	Таблетки, покрытые оболочкой 0,02	ФК	Гиперчувствительность, беременность (I триместр).
22. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ			
Флукамезол	Раствор для внутривенного введения 5мг/мл/5мл	ФК	Гиперчувствительность, пациенты, получающие бензодиазепины для лечения жизнеугрожающих состояний (в т.ч. для контроля внутричерепного давления, эпилептический статус), передозировка циклических антидепрессантов.